膵癌リスクファクター確認票

以下のリスクファクターに該当する場合は、このリスクファクター確認票の項目をチェックのうえ、診療情報提供書と併せて消化器内科宛てにご紹介いただきますようお願いいたします。

フリガ		生年月日	明·大·昭·平	年 月	日
1群	有症症状、臨床所見例				
	■ 膵癌が疑われる症状				
	□腹痛 □食欲不振 □早期腹満感 □黄; □その他(直 □背部痛	□体重減少)
	腫瘍マーカー				
	□CA19-9(37 U/ML以上) □Dupan II (150 U/ML以上) □Span- I (30 U/ML以上) □その他()
	■ 血中膵酵素				
	□エラスターゼ I (400 NG/DL以上) □アミラーゼ(250 IU/L以上) □その他()
	□主膵管 (MPD) の拡張 (MPD ≧ 3mm)				
	□膵腫瘍 (頭部 ・ 体部 ・ 尾部)				
	□膵管内乳頭粘液性腫瘍 (IPMN)				
	□膵嚢胞				
	その他()
2群 糖尿病例					
	2型糖尿病新規発症 (年	月頃か	ら)		
	糖尿病コントロール不良(年	月頃か	ら)		
	その他()
3群 リスクファクター (50歳以上で以下に該当する方)					
	家族歴 膵癌家族歴あり(1人いる	と4.5倍、2/	人いると6.4倍)		
	遺伝性 遺伝性膵炎(40~87倍)				
	"乳癌卵巢癌症候群(乳癌、	卵巣癌の既	注歴ある方) (4.1~5.7倍)	
	"ポイツ・ジェガーズ症候郡	ポイツ・ジェガーズ症候群(132倍)			
	"家族性多発母斑黒色腫症値	家族性多発母斑黒色腫症候群(13~22倍)			
	ッ リンチ症候群(遺伝性非ポリポーシス性大腸癌) (8.6倍)				
	ッ 大腸腺種ポリポーシス(4	大腸腺種ポリポーシス(4.4倍)			
	合併症 慢性膵炎(6.9倍)				
	" 肥満 (BMI 30以上 3.5倍)	肥満 (BMI 30以上 3.5倍)			
	嗜 好 喫煙 (1.68倍)	好			
	" 大量飲酒 (アルコール37.5gで1.22倍)				
	職業塩素化炭化水素暴露に関れ	つる職業(2.	21倍)		
	その他()